

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия**

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»

**Социально-гигиенический мониторинг и
информационного обеспечения ФБУЗ**

Информационный бюллетень

**«Анализ динамики наркоманий, хронического
алкоголизма и алкогольных психозов
в Республике Бурятия за 2015 год».**

Улан-Удэ
2016 г.

Информационный бюллетень составлен по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия, ГАУЗ «Республиканского наркологического диспансера» министерства здравоохранения Республики Бурятия (стат.форма №11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами»), предоставляемым в республиканский фонд данных социально-гигиенического мониторинга в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2006 г. №60 «Об утверждении положения о проведении социально-гигиенического мониторинга.

Составители: Е.Е. Багаева, Е.В. Мадеева, Л.В. Макарова, Л.Е. Богданова, М.В. Ткачева

Содержание

стр.

Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами, всего	4
Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)	6
Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)	7
Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомании)	8
Синдром зависимости от ненаркотических веществ (токсикомании)	

Заболееваемость наркологическим расстройтвами

В Республике Бурятия в 2015 году показатель первичной заболеваемости наркологическими расстройтвами составил 192,7 сл. на 100 тыс. населения, что ниже показателя по Российской Федерации за 2014 г. на 2,2% (197,0 – за 2014 г. по РФ) и выше уровня предыдущего года на 0,9 % (в 2014 г.190,9 сл.на 100 тыс. населения, в 2013 г. 154,1).(рис. 1)




Рис.1 Динамика первичной заболеваемости наркологическими расстройтвами 2006-2015 г.г.

В 11 районах республики и г. Улан-Удэ показатель первичной заболеваемости наркологическими расстройтвами выше среднереспубликанского уровня – Кяхтинский 324,9, Джидинский 320,2, Тарбагатайский 318,2, Селенгинский 306,6, Баунтовский 272,5, Кижингинский 256,0, Кабанский 236,7, Мухоршибирский 230,6, Тункинский 223,8, Заиграевский 218,9, Прибайкальский 200,8 (рис. 2).

Рис. 2




Рис.2 Уровень первичной заболеваемости наркологическими расстройствами по районам республики за 2015 г.

В структуре первичной заболеваемости наркологическими расстройствами за 2015 г. первое ранговое место занимает употребление наркотических веществ с вредными последствиям 58,2%, на втором месте хронический алкоголизм – 16,4%, на третьем месте употребление алкоголя с вредными последствиями – 11,6%, на четвертом месте алкогольный психоз – 9,3%, на пятом месте наркомания – 3,8%, на шестом – употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями – 0,6%, на седьмом месте – токсикомания 0,2% от общего числа заболевших наркологическими расстройствами (рис.3).




Рис.3 Структура первичной заболеваемости наркологическими расстройствами по республике Бурятия за 2015 г.

В возрастной структуре первичной заболеваемости наркологическими расстройствами преобладает население трудоспособного возраста: 20-39 лет – 66 %, второе место занимает возрастная группа 40-59 лет – 26,1% (таблица 1).

Таблица 1

Возрастная структура первичной заболеваемости наркологическими расстройствами по Республике Бурятия за 2015 г.

возраст, лет	%
0-14	0,4
15-17	3,0
18-19	1,7
20-39	66,0
40-59	26,1
60 лет и старше	2,8

Доля женщин в структуре первичной заболеваемости наркологическими расстройствами составила 13,9%.

Заболеваемость психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)

Относительный показатель заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (алкогольными психозами), составил по республике в 2015 г. 17,9 случаев на 100 тыс. населения (в 2014 г. 20,1 сл. на 100 тыс., в 2013 г. - 20,5), что ниже показателя по Сибирскому Федеральному округу на 29,6 % (23,2 сл. на 100 тыс. населения в 2015 г. по СФО). Выше республиканского показателя отмечается уровень заболеваемости в Кабанском районе 32,8, Тункинском 28, Тарбагатайском 27,7, г. Улан-Удэ 24,5, Селенгинском 23,1, Баунтовском 22,7, Мухоршибирском 21,0, Окинском и Муйском 18,5 сл. на 100 тыс. населения.

В возрастной структуре на первом месте лица в возрасте 40 – 59 лет – 46,9%, на втором месте – возрастная группа 20-39 лет - 37,7 %. Наибольшее доля больных алкогольным психозом – мужчины 71,4%.




Рис. 4 Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)

Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)

Относительный показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом составил в среднем по республике в 2015 г. 31,6 сл. на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2014 г. на 20,4% (39,7 сл. на 100 тыс. населения в 2014 г., 37,9 – в 2013 г.) и ниже показателя по Сибирскому Федеральному округу за 2015 г. в 1,6 раза (52 сл. на 100 тыс. населения). (рис. 5)




Рис.5 Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)

Выше республиканского показателя отмечается уровень заболеваемости хроническим алкоголизмом в Кижингинском 128,0, Баунтовском 79,5, Джидинском 66,4, Тарбагатайском 55,3, Курумканском 42,4, Кяхтинском 41,9, г. Улан-Удэ 40,4, Муйском и Окинском 37, Мухоршибирском 33,5 сл. на 100 тыс. населения.

В возрастной структуре на первом месте лица в возрасте 40 – 59 лет – 48,5%, на втором месте – возрастная группа 20-39 лет – 45,6 %. Наибольшее доля больных алкогольным психозом – мужчины 66,3%.

Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомании)

Показатель впервые зарегистрированного синдрома зависимости от наркотических веществ в 2015 г. составил 7,3 сл. на 100 тыс., что ниже уровня предыдущего года на 23,7 % населения (в 2014 г. – 5,9, в 2013 г. – 4,1).

Первичная заболеваемость наркоманией зарегистрирована 9 районах - в Баргузинском 8,9, Джидинском 3,9, Кабанском, 6,9, Кяхтинском 7,9, Мухоршибирском 41,9, Селенгинском 9,2, Тункинском 9,3, Муйском 27,8 и г. Улан-Удэ 9,7 сл. на 100 тыс.

81,7% заболевших наркоманией составляют лица молодого возраста 20-39 лет, 94,4 % -мужчины.

Синдром зависимости от ненаркотических веществ (токсикомании)

Уровень заболеваемости токсикоманией остался в 2015 г. на уровне предыдущего года и составил 0,3 сл. на 100 тыс. (в 2014 г. – 0,3, в 2013 г. – 0,2). Заболеваемость зарегистрирована в 3 районах – Закаменском 3,7, Мухоршибирском 4,2, Селенгинском 2,3 сл. на 100 тыс.